



## FUNGICIDA, INSECTICIDA Y ACARICIDA ORGÁNICO DE CONTACTO

### DESCRIPCION

**SAJRA:** Es un producto a base de caldo Sulfocálcico líquido, de contacto y por la emanación de olores es repelente de animales y plagas, rápido y efectivo para control directo de plagas menores como: lepidópteros, ácaros, pulgones, trips, arañuelas, cochinillas escamosas, fijado en hojas, tallos y contorno foliar.

### COMPOSICIÓN:

- Cal
- Azufre
- Extracto de ulupica nativa (*Capsicum Cardenasi*)
- Extracto de muña (*Lt. Menta pulegium*)
- Aceite vegetal agrícola
- Agua

**ROQUINAT**  
*Innovar es parte de nuestra naturaleza*

### CARACTERISTICAS

### DOSIS:

**SAJRA** Es una formulación de aplicación foliar 500 cc para una mochila de 20 lt de agua.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

La dosis es de 5 lts/ha, o bien, 500 cc. de **SAJRA** mezclar bien con 20 litros de agua en una mochila para aplicación foliar.

El producto es preventivo y de contacto para controlar plagas, solo afecta las plagas de la superficie de la planta, se debe bañar la planta y plagas. Tiene buena tenacidad por

la acción de permanecer en la planta lo necesario, controlando trips, pulgones, pulguilla saltona, escamas, lepidoptheros y otros, no aguanta las aplicaciones en lluvia, tampoco en floración, es repelente para animales por el sabor amargo que deja, por los olores fuertes de los extractos, el azufre se desvanece desprendiendo un fuerte olor.

Control de mildius, oídio en cultivos como, cebolla, Tomate, Hortalizas, frutales, papa, maíz, soya, girasol y otros, también controla en ornamentación, jardinería y floricultura en general.

Es compatible con otros productos orgánicos, con mezcla de Biol, aceites agrícolas de origen vegetal, extractos de plantas, y se sugiere no aplicar en plena floración al follaje, causa aborto floral.

CULTIVO	PLAGA/EFFECTO EN LA PLANTA	DOSIS
Papa, cebolla, Frutales, Haba, Hortalizas, Quinua y otros.	Control de pulguilla, lepidoptheros, pulgón, ácaros, arañuelas, trips, escamas, mildiu, oídio, tizón, alternaria, cercospora y otros.	0.5 Litros / 20 litros de agua en una mochila u otro sistema de aspersión de su preferencia. Se debe empezar el tratamiento antes de que se presente la enfermedad de manera general, y repetir con una frecuencia de 7 a 14 días según condiciones favorables de clima.

#### OBSERVACIONES:

- Lea muy bien las instrucciones antes de utilizar el producto
- No ingerir o inhalar, evitar el contacto con los ojos
- Almacenar en su propio envase en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y animales
- Olor penetrante fuerte a azufre, color rojizo-amarillo

**PROQUINAT**  
*Innovar es parte de nuestra naturaleza*

